



DEPARTEMENT DE LA CREUSE
COMMUNE DE ROYERE-DE-VASSIVIERE

Plan Local d'Urbanisme

ZNIEFF

10.2

 **SAUNIER
& ASSOCIÉS**

SAUNIER ET ASSOCIES

Pôle Aménagement du Territoire - Département Urbanisme
205, Avenue Georges Clémenceau - 92024 Nanterre Cedex
Tel: 01.70.92.32.00 - Fax: 01.57.67.17.95

PRESCRIPTION

ARRET DE LA REVISION

ENQUETE PUBLIQUE

APPROBATION

Znieff

VALLEE DU TAURION : RIGOLE DU DIABLE

ZNIEFF N° : 279

Surface : 33 ha

Zones Naturelles
d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique

Communes

Le Monteil-au-Vicomte (23), Royère-de-Vassivière (23)

Description et intérêt du site

Dans ce secteur, entre la roche du Diable et le pont de Châtain sur la RD 7, le Taurion devient particulièrement agité. De nombreux rochers donnent au ruisseau l'aspect d'un petit torrent de montagne. Le site est d'ailleurs fréquenté régulièrement par les kayakistes et une compétition de niveau national est organisée annuellement. Le vallon de la Rigole du Diable est relativement encaissé; les milieux qui bordent le Taurion sont principalement boisés (plantations de résineux ou hêtraies). Par place, on peut observer quelques parcelles de landes sèches abritant des espèces rares et protégées. Des petites mégaphorbiaies rivulaires sont visibles çà et là le long de la rivière.

Au plan botanique, l'intérêt principal est dû à la présence de nombreuses espèces de lichens et de mousses sur les rochers particulièrement abondants sur le site. Certaines de ces espèces sont rares et caractéristiques comme *Haematomma ventosum* ou encore *Lobaria scrobiculata*. Chez les ptéridophytes, une plante rare et protégée est à signaler : le lycopode à massue. Cette plante est en voie de régression un peu partout en France.

Au plan faunistique, les espèces intéressantes observées sont toutes liées à l'eau : la loutre chez les mammifères et le cincle plongeur chez les oiseaux. Ces deux espèces sont particulièrement sensibles aux perturbations du milieu et préfèrent, pour se développer, des milieux calmes et peu fréquentés.

Cette ZNIEFF de type I est incluse dans la ZNIEFF de type II (n° 908) intitulée "Vallée du Taurion" qui a été proposée comme site d'importance communautaire dans le cadre de la mise en place du réseau Natura 2000.

Milieux déterminants

Cours d'eau : zone à truite
Landes sèches
Pelouses atlantiques à nard et communautés proches
Prairies mésophiles
Végétation des rochers et falaises intérieures siliceuses

Espèces déterminantes

Faune

Mammifères

Loutre d'Europe (*Lutra lutra*) (Protection nationale, Directive Habitats)

Oiseaux

Cincle plongeur (*Cinclus cinclus*) (Protection nationale)


Flore

Gymnocarpium dryoptère (*Gymnocarpium dryopteris* / (newm.)) (Protection départementale)*Haematomma ventosum* (*Haematomma ventosum*) (lichen)*Lobaria scrobiculata* (*Lobaria scrobiculata*) (lichen)Lycopode à massue (*Lycopodium clavatum*) (Protection régionale)Polistic des montagnes (*Oreopteris limbosperma*) (Protection départementale)*Sphaerophorus globosus* (*Sphaerophorus globosus*) (lichen)

Zones Naturelles
d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique

ZNIEFF N° : 279

Echelle : 1/ 25 000^{ème}



 Contour de la ZNIEFF



Znieff

Zones Naturelles
d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et FloristiqueVALLEE DU TAURION : TOURBIERE DES
ALANCHATTES

ZNIEFF N° : 282

Surface : 18 ha

Commune

Royère-de-Vassivière (23)

Description et intérêt du site



Signalée très récemment par l'Office National des Forêts, cette tourbière est localisée dans une alvéole typique de la région du plateau de Millevaches. Ce fond tourbeux est, comme un peu partout dans la région, une zone de source pour de nombreux ruisseaux. Dans le cas de cette tourbière, les ruisseaux iront rejoindre le lac de Lavaud-Gelade.

L'intérêt du site est botanique. Plusieurs espèces remarquables y ont été trouvées dont une particulièrement rare en Limousin : l'andromède à feuilles de polium (protégée en France). Cette plante de la famille des bruyères appartient au cortège des espèces boréo-montagnardes, elle occupe sur le site une surface d'environ 200m². C'est une relique glaciaire qui n'est connue que dans trois secteurs en Limousin. L'essentiel du cortège des plantes des tourbières a été recensé dans cette ZNIEFF.

La faune n'a pas fait l'objet de recherches approfondies, cependant le site offre de bonnes potentialités compte tenu de sa composition floristique.

Ce site fait partie d'une propriété du département de la Creuse.

Cette ZNIEFF de type I est incluse dans une ZNIEFF de type II (N° 908) intitulée "Vallée du Taurion".

Milieux déterminants

Tourbières de transition,
tourbières tremblantes

Tourbières bombées, faciès
dégradé à molinie

Landes humides

Espèces déterminantes

Flore

Andromède à feuilles de polium (*Andromeda polifolia*)
(Protection nationale)

Canneberge (*Vaccinium oxycoccos*)

Laîche noirâtre (*Carex nigra*)

Linaigrette engainée (*Eriophorum vaginatum*)

Sorbier blanc (*Sorbus aria*)

Trèfle d'eau (*Menyanthes trifoliata*)

Znieff

Zones Naturelles
d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique


Creuse

VALLEE DU TAURION : TOURBIERE DES ALANCHATTES

ZNIEFF N° : 282

Surface : 18 ha

Echelle : 1/ 25 000^{ème}





Zones Naturelles
d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique

VASSIVIERE : VALLEE DE LA MAULDE VERS CHATAIGNOUX FAFREIX

ZNIEFF N° : 907

Surface : 102 ha

Communes

Saint-Martin-Château (23), Peyrat-le-Château (87)
Royère-de-Vassivière (23)

Description et intérêt du site

La ZNIEFF est située à l'aval du barrage de Vassivière. A cet endroit, la Maulde est encore un petit ruisseau au courant rapide et aux eaux vives. Les bois qui couvrent les versants de la vallée sont occupés par de belles hêtraies où l'on peut encore observer de nombreux arbres relativement âgés.

L'intérêt du site reposait sur la présence d'une plante exceptionnelle pour le Limousin. Il s'agit d'une fougère primitive de la famille des lycopodes : *Huperzia selago*. Cette plante se développait sur les rochers situés au milieu du cours de la rivière. Malheureusement, d'importants lâchers d'eau du barrage de Vassivière ont détruit la station de cette espèce végétale connue de cette seule localité en Limousin.

Des recherches entreprises par plusieurs botanistes n'ont pas permis de la retrouver même dans la partie aval de la vallée. La ZNIEFF a été conservée avec un intérêt moindre, en raison de la présence d'autres espèces remarquables. Parmi les plantes nous citerons le séneçon fausse cacalie (endémique du Massif Central et protégé en Limousin). Quelques espèces animales contribuent également à la valeur du site comme le cincle plongeur, oiseau nicheur sur le secteur et diverses espèces d'oiseaux de passage comme le merle à plastron.

Cette ZNIEFF de type I est incluse dans la grande zone de type II (n°906) appelée "Lac de Vassivière".

Milieux déterminants

Cours d'eau : zone à truite

Hêtraies

Végétation des rochers et falaises
intérieures siliceuses

Espèces déterminantes

Faune

Oiseaux

Cincle plongeur (*Cinclus cinclus*) (Protection nationale)

Flore

Campanille à feuilles de lierre (*Wahlenbergia hederacea*)

Renoncule à feuilles d'aconit (*Ranunculus aconitifolius*)

Séneçon fausse cacalie (*Senecio cacaliaster*) (Protection régionale)



Znieff

Zones Naturelles
d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique



Creuse Haute-Vienne


VASSIVIERE : VALLEE DE LA MAULDE VERS CHATAIGNOUX FAFREIX

ZNIEFF N° : 907

Surface : 102 ha

Echelle : 1/ 25 000^{ème}





Zones Naturelles
d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique

VALLEE DU TAURION

ZNIEFF N° : 908

Surface : 6 220 ha

Communes

Châtelus-le-Marcheix (23), Saint-Martin-Sainte-Catherine (23), Banize (23)
Saint-Pierre-Chérignat (23), Les Billanges (87), Saint-Laurent-les-églises (87)
Bosmoreau-les-Mines (23), Bourgneuf (23), Chavanat (23)
Gentioux-Pigerolles (23), Mansat-la-Courrière (23), Masbaraud-Mérignat (23), Le Monteil-au-Vicomte (23)
Pontarion (23), La Pougé (23), Royère-de-Vassivière (23), Saint-Dizier-Leyrenne (23), Saint-Hilaire-le-Château (23)
Saint-Marc-à-Loubaud (23), Saint-Yrieix-la-Montagne (23), Sardent (23), Soubrebost (23), Thauron (23)
Vallière (23), Vidaillat (23), Ambazac (87), Le Châtenet-en-Dognon (87), Saint-Martin-Terressus (87), Ceyroux (23)
La Nouaille (23), Saint-Pierre-Bellevue (23), Saint-Priest-Taurion (87)



Description et intérêt du site

Le Taurion est un affluent en rive gauche de la Vienne. Il prend sa source en Creuse vers Gentioux-Pigerolles, sur le plateau de Millevaches. Dans sa partie amont, le Taurion traverse de nombreuses landes tourbeuses et tourbières, jusqu'à la rigole du Diable, site bien connu des kayakistes. Le barrage de Lavaud-Gelade a inondé de nombreux fonds tourbeux laissant la place aujourd'hui à un lac de retenue. Au-delà, la rivière coule dans une vallée qui va progressivement s'encaisser. Plusieurs barrages hydroélectriques ont été construits dans cette partie encaissée : barrage de l'Etroit, barrage de la Roche-Thalamie, barrage de Saint-Marc et barrage de Chauvan. La limite 1ère et 2ème catégorie se situe à Bourgneuf.

Au plan écologique, la vallée du Taurion présente une grande richesse de milieux remarquables : tourbières et landes humides dans le secteur amont, forêts de pente et hêtraies dans la zone aval. C'est également dans cette zone que persistent très localement des landes sèches sur les endroits bien exposés sur sol peu profond.

La vallée est relativement calme et sauvage, ce qui permet l'accueil de certaines espèces de vertébrés particulièrement farouches comme la genette ou la loutre. De nombreuses espèces de faune et de flore ont été recensées ces dernières années révélant une richesse biologique insoupçonnée. Pour de plus amples renseignements sur les espèces et les milieux, on se reportera utilement aux fiches ZNIEFF des 17 zones de type I (N° 54, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 285 et 904) définies le long du Taurion.

Cette zone a été proposée comme site d'importance communautaire dans le cadre de la mise en place du réseau Natura 2000.

Milieux déterminants

Cours des rivières
Landes humides
Landes sèches
Forêts mélangées de ravins et de pentes
Tourbières acidiphiles bombées

Espèces déterminantes

Faune

Mammifères

Barbastelle d'Europe (*Barbastella barbastellus*) (Protection nationale, Directive Habitats)
Genette d'Europe (*Genetta genetta*) (Protection nationale)
Loutre d'Europe (*Lutra lutra*) (Protection nationale, Directive Habitats)

Oiseaux

Cincle plongeur (*Cinclus cinclus*) (Protection nationale)
Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*) (Protection nationale, Directive Oiseaux)

Reptiles

Lézard vivipare (*Lacerta vivipara*) (Protection nationale)

Poissons

Truite fario (*Salmo trutta fario*) (Protection nationale partielle)

Insectes

Damier de la succise (*Lépidoptère*) (*Euphydryas aurinia*) (Protection nationale, Directive Habitats)

Crustacés

Écrevisse à pattes blanches (*Austropotamobius pallipes*) (Protection nationale partielle, Directive Habitats)

Mollusques

Moule perlière (*Margaritifera margaritifera*) (Protection nationale, Directive Habitats)

Flore

Androsème toute saine (*Hypericum androsaemum*) (Protection départementale)
Cystopteris fragile (*Cystopteris fragilis*) (Protection régionale)
Drosera à feuilles rondes (*Drosera rotundifolia*) (Protection nationale)
Drosera intermédiaire (*Drosera intermedia*) (Protection nationale)
Flûteau nageant (*Luronium natans*) (Protection nationale, Directive Habitats)
Gentiane pneumonanthe (*Gentiana pneumonanthe*) (Protection régionale)
Isoètes à spores spinuleuses (*Isoetes echinospora*) (Protection nationale)
Isopyre faux pigamon (*Isopyrum thalicroides*) (Protection nationale)
Littorelle à une fleur (*Littorella uniflora*) (Protection nationale)
Lycopode à massue (*Lycopodium clavatum*) (Protection régionale)
Millepertuis à feuilles linéaires (*Hypericum linariifolium*) (Protection régionale)
Polistic des montagnes (*Oreopteris limbosperma*) (Protection départementale)
Sibthorpe d'Europe (*Sibthorpia europaea*) (Protection régionale)



VALLEE DU TAURION

Znieff

Zones Naturelles
d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique

ZNIEFF N° : 908

Surface : 6 220 ha



Znieff

VALLEE DU TAURION


ZNIEFF N° : 908

Surface : 6 220 ha

Zones Naturelles
d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique

Partie 1

Echelle : 1/ 100 000^{ème}



Znieff

VALLEE DU TAURION


ZNIEFF N° : 908

Surface : 6 220 ha

Zones Naturelles
d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique

Partie 2

Echelle : 1/ 100 000^{ème}



Znieff

VALLEE DU TAURION

ZNIEFF N° : 908


Surface : 6 220 ha

Limousin

Zones Naturelles
d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique

Partie 3

Echelle : 1/ 100 000^{ème}




VALLEE DU TAURION


ZNIEFF N° : 908

Surface : 6 220 ha

Zones Naturelles
d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique

Partie 4

Echelle : 1/ 100 000^{ème}



VASSIVIERE : TOURBIERE D'AUZOUX-AUCHAISE

ZNIEFF N° : 267

Surface : 45 ha

Zones Naturelles
d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique

Commune

Royère-de-Vassivière (23)



Description et intérêt du site

La tourbière d'Auzoux-Auchaise est située à proximité du lac de Vassivière dans un petit fond tourbeux noyé ces dernières années sous l'eau d'un étang. Les différents milieux naturels du site présentent tous les stades d'évolution depuis la zone d'eau stagnante jusqu'à la lande humide à molinie. En périphérie, on trouve des plages de pelouse sèche à nard avant d'atteindre sur les buttes, qui jouxtent le site, la lande sèche à callune. Cet espace présente aussi divers stades d'évolution puisque l'on peut observer des secteurs de lande à callune bien ouverte comme des secteurs de fourrés à genévrier. Ces différents milieux forment un ensemble très pédagogique qui permet d'illustrer l'histoire des formations végétales du plateau de Millevaches.

Au plan botanique, le site présente une flore exceptionnelle pour une si petite zone. Plusieurs espèces protégées ont été signalées : spiranthe d'été, lycopode à massue, drosera à feuilles rondes et drosera intermédiaire. De plus, il abrite d'autres plantes dignes d'intérêt pour leur rareté, leur répartition ou leur typicité : narthécie des marais, rhynchospora blanc, linaigrette à feuilles étroites, linaigrette engainée.

Au plan faunistique, le site est également riche et remarquable aussi bien pour les vertébrés (busard Saint-Martin, engoulevent d'Europe) que pour les invertébrés (sympetrum noir).

Cette ZNIEFF de type I est comprise dans la vaste ZNIEFF de type II n° 906 intitulée "lac de Vassivière" et a été proposée comme site d'importance communautaire dans le cadre de la mise en œuvre du réseau Natura 2000.

Milieux déterminants

Landes humides

Landes sèches

Tourbières de transition, tourbières
treublantesCommunautés à *Rhynchospora alba*

Bas-marais acides

Espèces déterminantes

Faune

Oiseaux

Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*) (Protection nationale, Directive Oiseaux)Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*) (Protection nationale, Directives oiseaux)

Reptiles

Lézard vivipare (*Lacerta vivipara*) (Protection nationale)

Insectes

Sympetrum noir (odonate) (*Sympetrum danae*)

Flore



Arnica des montagnes (*Arnica montana*)Canneberge (*Vaccinium oxycoccos*)Drosera à feuilles rondes (*Drosera rotundifolia*) (Protection nationale)Drosera intermédiaire (*Drosera intermedia*) (Protection nationale)Linaigrette à feuilles engainées (*Eriophorum vaginatum*)Lycopode à massue (*Lycopodium clavatum*) (Protection régionale)Narthécie des marais (*Narthecium ossifragum*)Rhynchospora blanc (*Rhynchospora alba*)Spiranthe d'été (*Spiranthes aestivalis*) (Protection nationale)Tréfle d'eau (*Menyanthes trifoliata*)

Zwölf

ZNIEFF N° : 267

Surface : 45 ha

Echelle : 1/ 25 000^{ème}

Zones Naturelles
d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique

Scan 25 ® © IGN1999
Autorisation n° 90-9068
Edition 2000

 Contour de la ZNIEFF





Zones Naturelles
d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique

VALLEE DU TAURION : TOURBIERE DE LA

MASURE

ZNIEFF N° : 278

Surface : 243 ha

Communes

Royère-de-Vassivière (23), Saint-Pierre-Bellevue (23)
Le Monteil-au-Vicomte (23)



Description et intérêt du site

Située entre le lac de Vassivière et le lac de Lavaud-Gelade, la tourbière de la Masure s'étend sur l'ensemble des zones de sources du ruisseau de Beauvais, à l'est de la RD 8. Ce fond tourbeux s'inscrit au sein d'un ensemble de milieux caractéristiques du plateau de Millevaches. Il s'agit d'une alvéole géomorphologique dont les versants accueillent des hêtraies et des landes sèches. Le fond est occupé par une vaste lande tourbeuse au sein de laquelle serpente le ruisseau de Beauvais. Ce site compte parmi les plus remarquables de la région en terme d'habitats bien conservés mais aussi en terme d'espèces rares et protégées.

Au plan botanique, l'ensemble du cortège des plantes des milieux tourbeux est présent : drosera à feuilles rondes, drosera intermédiaire, narthécie des marais, rhynchospora blanc, etc., mais aussi une représentation des espèces végétales des ruisseaux aux eaux oligotrophes : flûteau nageant, isoètes à spores spinuleuses.

Au plan faunistique, outre les espèces liées aux zones humides et à l'eau (loutre, truite fario, lézard vivipare, etc.) on note également bon nombre d'animaux liés aux vastes zones ouvertes, principalement chez les oiseaux : busard Saint-Martin, circaète Jean-le-Blanc, pipit farlouse.

Cette tourbière est une ZNIEFF de type I contenue dans la ZNIEFF de type II (n° 908) intitulée "Vallée du Taurion".

Milieux déterminants

Cours d'eau : zone à truite
Landes sèches
Landes humides
Mégaphorbiaies montagnardes
Tourbières de transition, tourbières
tremblantes

Espèces déterminantes

Faune

Mammifères

Loutre (*Lutra lutra*) (Protection nationale, Directive Habitats)

Oiseaux

Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*) (Protection nationale, Directive Oiseaux)

Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*) (Protection nationale, Directive Oiseaux)

Pipit farlouse (*Anthus pratensis*) (Protection nationale)

Reptiles

Lézard vivipare (*Lacerta vivipara*) (Protection nationale)

Poissons

Truite fario (*Salmo trutta fario*) (Protection nationale partielle)

Flore

Arnica des montagnes (*Arnica montana*)

Campanille à feuilles de lierre (*Wahlenbergia hederacea*)

Drosera à feuilles rondes (*Drosera rotundifolia*) (Protection nationale)

Drosera intermédiaire (*Drosera intermedia*) (Protection nationale)

Flûteau nageant (*Luronium natans* / (L.) rafin) (Protection nationale, Directive Habitats)

Isoètes à spores spinuleuses (*Isoètes echinospora*) (Protection nationale)

Littorelle à une fleur (*Littorella uniflora*) (Protection nationale)

Narthécie des marais (*Narthecium ossifragum*)

Rhynchospora blanc (*Rhynchospora alba*)

Sorbier blanc (*Sorbus aria*)

Trèfle d'eau (*Menyanthes trifoliata*)



Zwölf

ZNIEFF N° : 278

Surface : 243 ha


Echelle : 1/ 25 000^{ème}


Leaves: Nature and
color of the Ecological,
Faunistic and Floristic



Scan 25 ® © IGN1999
Autorisation n° 90-9068
Edition 2000

Contour de la ZNIEFF





Zones Naturelles
d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique

VASSIVIERE : FOND TOURBEUX DES GORSES

ZNIEFF N° : 270

Surface : 16 ha

Commune

Royère-de-Vassivière (23)

Description et intérêt du site

Située au nord-est de Magrangeas sur la commune de Royère-de-Vassivière dans la ZNIEFF de type II n° 906 intitulée "Lac de Vassivière", cette petite tourbière présente plusieurs aspects intéressants.



Le fond tourbeux est principalement recouvert par la lande humide dégradée à molinie avec une bonne représentation de callune et bruyère à quatre angles. Le milieu semble être envahi par la molinie qui "étouffe" la végétation typique de la tourbière. Il serait souhaitable d'intervenir rapidement sur ce site qui est en voie d'atterrissement.

Au plan botanique, on observe au sein de la tourbière, de nombreuses stations à linaigrette engainée. On note également la présence de plusieurs mares tourbeuses (appelées "gouilles") où domine le rhynchospor blanc. En périphérie de ces gouilles, on trouve aussi de belles stations de drosera à feuilles rondes et de canneberge.

Au plan faunistique, le lézard vivipare est très implanté sur le site. Il s'agit d'un petit lézard typiquement inféodé aux tourbières.

Cette ZNIEFF est proposée comme site d'importance communautaire dans le cadre de la mise en œuvre du réseau Natura 2000.

Milieux déterminants

Tourbières bombées, faciès
dégradé à molinie

Tourbières acidiphiles de
couverture

Espèces déterminantes

Faune

Reptiles

Lézard vivipare (*Lacerta vivipara*) (Protection nationale)

Flore

Canneberge (*Vaccinium oxycoccos*)

Drosera à feuilles rondes (*Drosera rotundifolia*) (Protection nationale)

Linaigrette à feuilles engainée (*Eriophorum vaginatum*)

Rhynchospor blanc (*Rhynchospora alba*)


Sorbier blanc (*Sorbus aria*)

Trèfle d'eau (*Menyanthes trifoliata*)

VASSIVIERE : FOND TOURBEUX DES GORSES


LIMOUSIN


Znieff

Zones Naturelles
d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique

ZNIEFF N° : 270

Surface : 16 ha

Echelle : 1/ 25 000^{ème}



Zones Naturelles
d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique

VALLEE DU TAURION : TOURBIERE-ETANG DU MOULIN DE PRUGNOLAS

ZNIEFF N° : 277

Surface : 92 ha

Commune

Royère-de-Vassivière (23)

Description et intérêt du site



L'étang de Prugnolas est situé à environ 3 kilomètres au nord de Royère-de-Vassivière à l'est de la RD 8. La zone tourbeuse s'étend sur une soixantaine d'hectares de part et d'autre de la RD 8. Le ruisseau de Haute-Faye se déverse dans l'étang de Prugnolas.

Au plan botanique, ce site est caractérisé par la présence de nombreuses espèces remarquables :

- des espèces protégées au plan national : drosera à feuilles rondes, littorelle à une fleur;
- des espèces protégées au niveau régional : gentiane pneumonanthe;
- des espèces rares et strictement inféodées aux zones tourbeuses : trèfle d'eau, canneberge, linaigrette engainée, linaigrette à feuilles étroites, scirpe cespiteux.

Une autre plante mérite d'être signalée, il s'agit du flûteau nageant, qui figure dans l'annexe II de la directive européenne Habitats, espèce dont le milieu doit être préservé.

Au plan faunistique, on a recensé sur ce site des oiseaux particulièrement rares comme le circaète Jean-le-Blanc, l'engoulevent d'Europe, le busard Saint-Martin. Parmi les insectes, il faut noter la présence de la galéruque de la scutellaire, petit coléoptère rare et surtout typiquement inféodé aux zones humides où croît sa plante hôte : la scutellaire.

Cette ZNIEFF de type I est incluse dans une ZNIEFF de type II n° 908 intitulée "Vallée du Taurion".

Milieux déterminants

Bas-marais acides

Formations amphibies des rives
exondées, des lacs, étangs et mares

Cours d'eau : zone à truite

Tourbières de transition, tourbières
tremblantes

Communautés à *Rhynchospora alba*

Espèces déterminantes

Faune

Oiseaux

- Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*) (Protection nationale, Directive Oiseaux)
- Cincla plongeur (*Cinclus cinclus*) (Protection nationale)
- Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*) (Protection nationale, Directive Oiseaux)
- Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*) (Protection nationale, Directive Oiseaux)

Reptiles

- Lézard vivipare (*Lacerta vivipara*) (Protection nationale)

Insectes

- Galéruque de la scutellaire (coléoptère) (*Phyllobrotica quadrimaculata*)

Flora

- Canneberge (*Vaccinium oxycoccos*)
- Drosera à feuilles rondes (*Drosera rotundifolia*) (Protection nationale)
- Gentiane pneumonanthe (*Gentiana pneumonanthe*) (Protection régionale)
- Flûteau nageant (*Luronium natans*) (Protection nationale, Directive Habitats)
- Linaigrette engainée (*Eriophorum vaginatum*)
- Littorelle à une fleur (*Littorella uniflora*) (Protection nationale)
- Parnassie des marais (*Parnassia palustris*)
- Rhynchospora blanc (*Rhynchospora alba*)
- Trèfle d'eau (*Menyanthes trifoliata*)

Znieff



VALLEE DU TAURION : TOURBIERE-ÉTANG DU MOULIN DE PRUGNOLAS

ZNIEFF N° : 277

Surface : 92 ha

Echelle : 1/ 25 000^{ème}

Zones Naturelles
d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique



Znieff

Zones Naturelles
d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique

TOURBIERE DU PUY DIES

ZNIEFF N° : 281

Surface : 15 ha

Commune


Royère-de-Vassivière (23)

Description et intérêt du site

La zone est localisée sur la commune de Royère-de-Vassivière en Creuse. Il s'agit d'une alvéole granitique au fond duquel se trouve une tourbière et des landes tourbeuses.

Les milieux rencontrés sont essentiellement des bas marais tourbeux. Le site présente un intérêt majeur pour la flore. Une espèce particulièrement rare et protégée en France y a été découverte: l'andromède à feuilles de polium. C'est une espèce boréo-montagnarde qui est beaucoup plus fréquente dans les tourbières de l'est de la France. En Limousin, elle n'est connue que dans deux autres secteurs.

D'autres espèces végétales ont également été recensées, elles appartiennent au cortège des plantes de tourbières comme la canneberge ou la linaigrette engainée.



Milieux déterminants

Landes humides
Tourbières bombées actives
Tourbières bombées, faciès dégradé à molinie
Tourbières de transition, tourbières tremblantes
Bas-marais acides

Espèces déterminantes

Flore



Andromède à feuilles de polium (*Andromeda polifolia*) (Protection nationale)
Canneberge (*Vaccinium oxycoccos*)
Drosera à feuilles rondes (*Drosera rotundifolia*) (Protection nationale)
Linaigrette engainée (*Eriophorum vaginatum*)
Violette des marais (*Viola palustris*)

Znieff

TOURBIERE DU PUY DIES

ZNIEFF N° : 281

Surface : 15 ha

Echelle : 1/ 25 000^{ème}Zones Naturelles
d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique

Znieff

Zones Naturelles
d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et FloristiqueVASSIVIERE : LANDE DU PUY DE LA CROIX ET
RIVAGE EST DE VASSIVIERE

ZNIEFF N° : 271

Surface : 102 ha

Commune

Royère-de-Vassivière (23)

Description et intérêt du site

Située en bordure est du lac de Vassivière, la lande du Puy de la Croix est une vaste lande sèche à genévriers envahie en grande partie par la fougère aigle.



On remarque une colonisation relativement rapide par diverses plantes : bourdaine, fougère, bouleau, pin. Récemment, des travaux de gestion ont été réalisés par l'Office National des Forêts, pour rajeunir la lande. Le décapage a été réalisé sur les zones où la fougère aigle formait des peuplements quasi-mono spécifiques. Sur le site, nous pouvons noter la présence de zones humides le long de petits ruisseaux, permettant l'installation de plantes des milieux tourbeux.

Le périmètre intègre, outre la lande sèche, les rivages du lac ainsi que les fonds tourbeux situés dans l'anse de la RD 34 juste avant d'arriver à la station de Masgrangeas.

Au plan botanique, plusieurs espèces remarquables sont à signaler. En premier lieu, le lycopode à massue, espèce relique en voie de régression et fortement menacée par l'enfrichement d'une très grande partie des stations connues en Limousin. Autre espèce remarquable, la narthécie des marais, plante d'affinité atlantique qui se retrouve à Vassivière en situation très orientale par rapport à son aire de distribution.

Cette ZNIEFF de type I, en partie propriété du Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres est contenue dans la grande ZNIEFF de type II n° 906 intitulée "Lac de Vassivière" et a été proposée comme site d'importance communautaire dans le cadre de la mise en œuvre du réseau Natura 2000.

Milieux déterminants

Landes sèches

Landes humides

Tourbières bombées, faciès
dégradé à molinieCommunautés à *Rhynchospora*
alba

Espèces déterminantes


Flore

Campanille à feuilles de lierre (*Wahlenbergia hederacea*)Lycopode à massue (*Lycopodium clavatum*) (Protection
régionale)Narthécie des marais (*Narthecium ossifragum*)Renoncule à feuilles d'aconit (*Ranunculus aconitifolius*)Sorbier blanc (*Sorbus aria*)

Zwölf

Echelle : 1/ 25 000^{ème}

A map of the Limoges region in France, showing the locations of Guéret, Limoges, and Tulle. The map is a simplified outline of the region with three dots indicating the locations. Guéret is at the top, Limoges is in the center, and Tulle is at the bottom. The names are written in capital letters next to their respective dots.



LAC DE VASSIVIERE


Znieff


ZNIEFF N° : 906

Surface : 7 614 ha

Zones Naturelles
d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique

Echelle : 1/ 100 000^{ème}





Zones Naturelles
d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique

VASSIVIERE : TOURBIERE DE MASGRANGEAS

ZNIEFF N° : 269

Surface : 33 ha

Commune

Royère-de-Vassivière (23)

Description et intérêt du site

Située au nord du lac de Vassivière, cette tourbière occupe le fond d'une alvéole granitique comme c'est le cas pour la quasi-totalité des tourbières du plateau de Millevaches.

Les milieux rencontrés sont classiques mais constituent tout de même des habitats rares et en voie de régression au niveau national et européen. Le site se compose d'une mosaïque de milieux tourbeux allant de la "gouille", petite mare tourbeuse, à la lande à molinie, en passant par de petits secteurs de tourbière tremblante.

Au plan botanique, on retrouve une bonne partie des espèces du cortège tourbeux : drosera à feuilles rondes, trèfle d'eau, canneberge, linaigrette engainée, rhynchospora blanc, etc.

Au plan faunistique, seule une espèce mérite d'être signalée : le lézard vivipare. Ce petit reptile est strictement inféodé aux tourbières et il est particulièrement bien représenté sur le plateau de Millevaches.

Cette ZNIEFF de type I est incluse dans une ZNIEFF de type II (n° 906) intitulée "Lac de Vassivière" et a été proposée comme site d'importance communautaire dans le cadre de la mise en œuvre du réseau Natura 2000.

Milieux déterminants

Cours d'eau : zone à truite

Landes humides

Pelouses atlantiques à nard et communautés proches

Tourbières bombées, faciès dégradé à molinie

Communautés à *Rhynchospora alba*

Espèces déterminantes

Faune

Reptiles

Lézard vivipare (*Lacerta vivipara*) (Protection nationale)

Flore

Canneberge (*Vaccinium oxycoccos*)

Drosera à feuilles rondes (*Drosera rotundifolia*) (Protection nationale)

Linaigrette engainée (*Eriophorum vaginatum*)

Rhynchospora blanc (*Rhynchospora alba*)

Trèfle d'eau (*Menyanthes trifoliata*)


Zweif

ZNIEFF N° : 269

Surface : 33 ha

Echelle : 1/ 25 000^{ème}

A map of the Limoges region in France. Three locations are marked with dots and labeled: GUÉRET in the north, LIMOGES in the center, and TULLE in the south. The map shows the outlines of the departments and some major roads.





Zones Naturelles
d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique

VASSIVIERE : TOURBIERE DU BOIS DES PIALLES (= TOURBIERE DE LAFOUILLERE)

ZNIEFF N° : 268

Surface : 24 ha

Commune

Royère-de-Vassivière (23)

Description et intérêt du site

Cette petite tourbière est située au nord-est d'Auzoux sur la commune de Royère-de-Vassivière, aux environs du lac de Vassivière.

Le fond tourbeux est principalement recouvert par la lande humide dégradée à molinie avec une bonne représentation de callune et de bruyère à quatre angles. Le milieu semble être envahi par la molinie qui "étouffe" la végétation typique de la tourbière.

Au plan botanique, de nombreuses stations à linaigrette engainée s'observent au sein de la tourbière. On note également la présence de plusieurs mares tourbeuses (appelées "gouilles") où domine le rhynchospora blanc. En périphérie de ces gouilles on trouve aussi de belles stations de drosera à feuilles rondes et de canneberge.

Au plan faunistique, le lézard vivipare est très implanté sur le site. Il s'agit d'un petit lézard typiquement inféodé aux tourbières.

Cette ZNIEFF de type I est contenue dans la grande zone de type II (N° 906) du Lac de Vassivière et est proposée comme site d'importance communautaire dans le cadre de la mise en place du réseau Natura 2000.

Milieux déterminants

Landes humides

Tourbières de transition,
tourbières tremblantes

Communautés à *Rhynchospora*
alba

Tourbières bombées, faciès
dégradé à molinie

Bas-marais acides

Espèces déterminantes

Faune

Reptiles

Lézard vivipare (*Lacerta vivipara*) (Protection nationale)

Flore

Canneberge (*Vaccinium oxycoccos*)

Drosera à feuilles rondes (*Drosera rotundifolia*) (Protection nationale)

Laîche noirâtre (*Carex nigra*)

Linaigrette engainée (*Eriophorum vaginatum*)

Rhynchospora blanc (*Rhynchospora alba*)

Trèfle d'eau (*Menyanthes trifoliata*)

Creuse

VASSIVIERE : TOURBIERE DU BOIS DES PIALLES (= TOURBIERE DE LAFOUILLERE)

ZNIEFF N° : 268

Surface : 24 ha

Echelle : 1/ 25 000^{ème}

Zones Naturelles
d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique

